

Documento de consenso de la SEA (Sociedad Española de Arteriosclerosis) sobre las indicaciones de los Inhibidores de PCSK9

CONDICIÓN CLÍNICA	NIVEL DE C-LDL (mg/dL) (tras tratamiento con máxima dosis de estatina tolerada + ezetimiba)	COMENTARIOS
HFHe	>130	
HFHe bajo riesgo	>160	Edad <40 años; sin factores de riesgo; Lp(a) < 50 mg/dL; no ECV isquémica familiar...)
HFHe + ECV ateromatosa	> 100	
HFHo		Al menos un alelo defectuoso. Evolocumab.
ECV ateromatosa estable	>130	Incluye cardíaca, cerebral y periférica oclusiva.
ECV ateromatosa clínicamente inestable; progresiva y/o recidivante; síndrome coronario agudo	>100	De cualquier localización: cardíaca, cerebral y periférica oclusiva
ECV ateromatosa + diabetes o Lp(a) > 100 mg/L	>100	
Diabetes + 2 factores de riesgo o albuminuria o FGe < 45 ml/min/1.73m ²	>130	<i>No incluida en indicaciones oficiales de uso</i>
Pacientes intolerantes a estatinas		Todas las condiciones anteriores + <i>prevención primaria con C-LDL > 190 mg/dL</i>

HFHe = Hipercolesterolemia familiar heterocigota; HFHo = Hipercolesterolemia familiar homocigota
 ECV = Enfermedad cardiovascular; FGe = Filtrado glomerular estimado

Este documento ha sido consensuado por Luis Masana, Juan F Ascaso, Fernando Civeira, Juan C Pedro-Botet, Pedro Valdivielso, Carlos Guijarro, José Mostaza, José López Miranda y Xavier Pinto en nombre de la Sociedad Española de Arteriosclerosis.